

Geelsprietdikkopje


(*Thymelicus sylvestris*)



Landschap:
Utrechtse Heuvelrug

Verbinding

Variatie, veiligheid & beheer



Stadsrand Heuvelrug

Meeliftende soorten

- Wilde bijen
- Bruine winterjuffer
- Hooibeestje
- Bruin zandoogje
- Kleine vuurvliinder
- Icarusblauwtje
- Zwartsprietdikkopje



Geelsprietdikkopje

(*Thymelicus sylvestris*)



Landschap:
Utrechtse Heuvelrug



Leefgebied

Het geelsprietdikkopje is een vrij schaarse standvlinder¹. De soort komt vooral voor in ruige graslanden (op zandgronden) die voldoende beschut zijn tegen de wind. Essentieel in de levenscyclus zijn grassen die in de winter blijven overstaan waarin eitjes worden gelegd en de rupsen overwinteren. De mannetjes zijn in de zomer zeer territoriaal en verdedigen hun nectarplanten fel. De Utrechtse Heuvelrug rond Amersfoort is een belangrijk leefgebied voor deze soort, waar gemiddeld 15 tot 70 vlinders per hectare gevonden kunnen worden.



Verblijfplaatsen

Verblijfplaatsen van de rupsen van geelsprietdikkopje bevinden zich in grassen die in de winter overstaan. Vlinders leggen hier (omstreeks juni-juli) hun eitjes in en rupsen overwinteren in deze grassen. Daarnaast zijn er voldoende nectarplanten nodig voor de vlinders.

- Leefgebied bestaat uit ruige graslanden op beschutte plekken gelegen (langs bosrand) en is tenminste 0,5 ha groot
- Waardplanten zijn breedbladige grassen die in het voorjaar voedzame scheuten hebben en in de winter blijven overstaan



Verbinding

- Aaneengesloten beschutte vegetaties van tenminste 5m breed dienen als verbinding tussen leefgebieden. De inrichting is gelijk aan het leefgebied
- Leefgebieden liggen maximaal 1km uit elkaar, maar het liefst maximaal 500m



Variatie

- Zorg voor een variatie aan nectarplanten en waardplanten om te voorkomen dat er slechts één soort nectar- en waardplant aanwezig is



Veiligheid

- Zorg voor de aanwezigheid van grassen die in de winter overstaan en maai elke maaibeurt slechts een gedeelte



Beheer

- Gefaseerd ecologisch maaibeheer (bijvoorbeeld volgens de richtlijnen van Kleurkeur) is nodig, waarbij elke keer tenminste 30% van de vegetatie blijft staan
- Voldoende bloemaanbod in de maanden juli en augustus is nodig
- In grote gebieden een zeer extensief begrazingsbeheer uitvoeren



Voedsel

- Tenminste 80% van het leefgebied bestaat uit een combinatie van waard- en nectarplanten. Middels gefaseerd ecologisch maaibeheer valt deze inrichting te behalen
- Voedsel adulte vlinder: nectarplanten zoals akkerdistel, gewone braam, gewone rolklaver of knooppkruid
- Voedsel rups: de waardplanten zwenkgras, geknikte vossestaart, duinriet, kweek, gestreepte witbol, gladde witbol, timoteegras en pijpenstrootje

¹ Een standvlinder is een vlindersoort die zich minstens 10 jaar binnen een gebied gevestigd (voortgeplant) heeft en gedurende het hele jaar in het gebied aanwezig is.



Schaalniveau

Stadsrand / buitengebied, wijk

