



Versie 28 11 2023

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus




groen (blauwe-)
routes

Deze vrolijk gekleurde vlinder vliegt makkelijk via bermen en tuinen dwars door de stad. Als hij maar in elke buurt een bloemenrijk veldje met (rol)klaver vindt om nectar te drinken en zich voort te planten. Hij is dol op spontane natuur, dus laat her en der een hoekje verwilderen.



Ook groene daken met geschikte nectar- en waardplanten dragen bij aan het leefgebied van het icarusblauwtje



Variatie in hoogte met gras-pollen waar icarusblauwtjes tijdens de nacht verblijven. Gefaseerd maaibeheer (z.o.z.).



Vlinderbloemigen als **kleine klaver, rolklaver en hopklaver** (en in mindere mate rode en witte klaver) vormen het voedsel voor de rupsen van het icarusblauwtje.



Kruiden- en bloemrijk gras, ruigte en onkruiden, met een gevarieerde structuur en hier en daar een struik of boom en met vlinderbloemigen.



Verblijfplaats



Voedsel



Verbinding



Variatie



Veiligheid



Icarusblauwtje

Polyommatus icarus



groen (blauwe-)
routes

Voor het leefgebied van het icarusblauwtje is het beheer van essentieel belang. Dat geldt voor verblijfplaatsen, voedsel, verbinding, variatie én veiligheid. Het icarusblauwtje vindt deze in bloemrijk grasland. Dit is te ontwikkelen en te behouden door grasland 1 - 3 x per jaar te maaien, waarna het maaisel wordt afgevoerd. Bij elke maaibeurt moet 10-30 % van de vegetatie blijven staan. Laat het maaibeheer bij voorkeur uitvoeren door een Kleurkeur-gecertificeerd bedrijf.



Verblijfplaatsen

Zomerverblijfplaatsen

- Beschut staande graspolen worden gebruikt als slaapplek van meerdere vlinders.
- Rupsen verblijven op de waardplanten waarvan ze eten.

Winterverblijfplaatsen

- Rupsen overwinteren in de strooisellaag of op de grond tegen de waardplant aan (zie onder voedsel).



Voedsel

De rupsen eten uitsluitend vlinderbloemigen, vooral kleine klaver, hopklaver en rolklaver, maar ook wel andere klavers. De volwassen vlinders drinken nectar, ook meest van vlinderbloemigen, maar daarnaast van diverse andere kruiden, zoals boerenwormkruid, jakobskruid, akkerdistel, koninginnenkruid en knoopkruid.

Dit vinden ze in bloemrijk grasland, waarin vlinderbloemigen voorkomen. Voor een populatie is minimaal 1 hectare nodig.



Verbinding

- Een groen(blauwe) route vormt een verbindingroute voor het icarusblauwtje, maar tegelijkertijd ook leefgebied.
- Een verbindingroute bestaat uit bloemrijk grasland

waarin vlinderbloemigen groeien, minimaal 500 m² per 100 m route.

- Bloemrijk grasland in route gemiddeld 5 m of breder. Minimaal 3 m breed.
- Onderbrekingen in verbindingroute maximaal 50 m.



Variatie

Gefaseerd maaibeheer om variatie in hoogte te bereiken en te zorgen voor voldoende schuilgelegenheid en bloeiende kruiden.

- Bij elke maaibeurt 10 - 30 % laten staan in een kleinschalig patroon (bijvoorbeeld per 50 m² een stuk van 10 m² laten staan).
- Elke maaibeurt blijft een ander deel staan.



Veiligheid

Voor de veiligheid van rupsen en vlinders:

- Gefaseerd maaibeheer.
- Niet maaien bij temperaturen onder 17 °C (bij bewolkt weer) of 13 °C (bij zonnig weer).
- Niet klepelen, maar gebruik een cirkelmaaier of nog beter een maaibalk.



Meer informatie

- Ontwikkeling en beheer grasland voor insecten: *Veldgids Ecologisch bermbeheer* (Stip, A. & J.E. Dijkhuis. 2021).
- Keurmerk voor insectenvriendelijk bermbeheer: Kleurkeur. Zie www.vlinderstichting.nl/kleurkeur.



Variatie en verbinding



Minimaal **500 m² bloemrijk gras** per 100 m
groen(blauwe) route




Maximaal **50 m** tussen
leefgebieden



Onderbreking in
verbinding max. **50 m**



100 m



Bloemrijk gras

Overig