




Oranjetipje

(*Anthocharis cardamines*)



Landschap:
Eemland, Gelderse Vallei



Meeliftende soorten

- Klein geaderd witje
- Citroenvlinder
- Grote weerschijnvlinder
- Wilde bijen
- Bosmetselbij
- Boomhommel
- Bosspitsmuis
- Wezel



Oranjetipje

(*Anthocharis cardamines*)



Landschap:
Eemland, Gelderse Vallei



Leefgebied

Oranjetipje is een algemene standvlinder¹ die in heel Nederland voorkomt. In het westen van Nederland en in droge gebieden, zoals op de Veluwe, komt de soort minder voor. In Amersfoort komt de soort gemeentebreed voor, maar worden de hoogste dichtheden gevonden in het gebied rond Bloedaal en De Schammer. Oranjetipje brengt het grootste deel van zijn leven als pop door en leeft vervolgens een week als imago. De soort heeft een korte vliegtijd tussen eind maart en half mei. Oranjetipje leeft op beschutte, vochtige hooilanden en bij zonnige ruigten in bosranden.



Verblijfplaatsen

Oranjetipje vliegt enkel in het voorjaar en heeft op dat moment voldoende beschutting nodig met zonnige plaatsen om op te warmen. Graslanden omgeven door houtwallen en bosranden hebben de voorkeur.

- Ei-afzet op waardplanten bij voorkeur op zonnige, beschutte plekken zoals greppels of in hooilanden nabij struweel of bosranden
- Belangrijke waardplanten zijn pinksterbloem en look-zonder-look, soms worden ook andere kruisbloemigen als lupine, gewone raket, ruige scheefkelk, gewoon barbakruid, raapzaad, herik, judaspenning, damastbloem en bittere veldkers gebruikt. In het leefgebied zijn minstens tienduizenden waardplanten nodig voor een duurzame populatie.
- Overwintering van de soort gebeurt als pop in de buurt van de waardplant op een boom, struik of stengel laag bij de grond
- Oranjetipje heeft minstens 50 hectare leefgebied nodig voor het onderhouden van een levensvatbare populatie (dichtheid gemiddeld 50 vlinders/ha). Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn, met tussenafstanden van maximaal 1 km. Van dit leefgebied bestaat circa 65% uit hooilanden en 35% uit houtwallen, struweel en bosranden.



Variatie

- De afstand tussen leefgebieden is maximaal 1 kilometer (indien opgaand groen aanwezig is; als er uitsluitend bebouwing tussen ligt is dat vele malen minder), maar het liefst (veel) minder
- Vochtige graslanden waar pinksterbloem of look-zonder-look voorkomen moeten binnen 10 tot maximaal 30 meter afstand van goed ontwikkelde ruigte of struweel liggen



Veiligheid

- Voldoende beschutting in de vorm van struweel in de zoom-/mantelvegetatie van de bosrand is een vereiste voor het oranjetipje



Beheer

- Eens in de 2 jaar gefaseerd snoeien van struweel aan bosranden, waarbij enkele oude takken van struiken en bomen worden weggesnoeid, zodat openingen in het struweel ontstaan. Snoeien in de nazomer
- Ecologisch maaibeheer: 2x per jaar gefaseerd maaien van de zoomvegetatie waarbij minimaal 30% blijft staan. Pas maaien na half juni. Maaien met een messenbalk of schotelmajaier. Bij voorkeur niet lager maaien dan 12 centimeter



Voedsel

- Voedselbronnen voor rupsen zijn de hawtjes en zaden van de waardplant. Eén pinksterbloem biedt doorgaans slechts voldoende voedsel voor één rups, waarbij een look zonder look plant meer rupsen kan huisvesten
- Adulte vlinders drinken nectar vaak van look-zonder-look en in vochtigere, voedselrijkere gebieden van pinksterbloem, daarnaast worden overige soorten als echte koekoeksbloem en paardenbloem gebruikt als nectarplant



Verbinding

Oranjetipjes zijn zeer mobiel en kunnen ver vliegen. Ze verplaatsen zich langs opgaand groen dat o.a. wordt gevormd door houtwallen en bosranden.

- Zonbeschenen bosranden of houtwallen van minimaal 5 (maar liefst tot 20) meter breed, ingericht als zoom-/mantelzone dienen als corridor en/of stapsteen tussen verschillende leefgebieden

¹ Een standvlinder is een vlindersoort die zich minstens 10 jaar binnen een gebied gevestigd (voortgeplant) heeft en gedurende het hele jaar in het gebied aanwezig is.



Schaalniveau

Stadsrand / buitengebied, wijk

